

## **Póréhagyma termesztés technológiai javaslatok**

A friss póréhagyma belföldi fogyasztása folyamatosan nő. Egész évben megtalálható az igényes zöldségkínálatot nyújtó boltok pultjain. A hazai termelők igyekeznek egész évben itthoni előállítású póréval megjeleníteni a piacokon. Ennek ellenére a belföldi frisspiaci igények meghaladják a saját termelésből származó kínálatot, ezért rendszeres az import.

### **Termesztési módok, vetési és ültetési időpontok, töltögetés**

Korai, frisspiaci termesztéshez fűtött termesztő berendezésekben február első felében vetik a precíziós magot. A vetéshez célszerű műanyag tálcát használni, mivel a palántáról nevelt hagymafélék gyökere erősen belekapaszkodik a hungarocell tálcákba, ezért kiültetéskor sok a gyökérsérült növény. A megedzett palántákat április végén ültetik ki, betakarításuk július közepétől kezdődik meg.

Nyári és őszi termesztéshez rendszerint áprilisban, hidegágyban vetünk lehetőség szerint tálcákba. Júniusi kiültetést követően a növények nyár végére már szedhetőek.

Téli tárolásra, szántóföldi átteleltetésre május elején vetünk szabadföldön és július első napjaiban palántázzuk ki. A felszedés még tél beállta előtt, illetve télen a fagymentes napokon történik. Az áttelelő póré tavaszra magzárát hoz, ezt megelőzően célszerű felszedni. Friss piaci értékesítésénél a lomb egy része is a tövön marad, ezért kívánatos megőrizni annak épségét, ami az átteleltetési technológiánál kétséges. A gyakorlatban egyre terjed a póré tárolása a hagyományos szántóföldi átteleltetés rovására. Mindegyik termesztési időpontnál jól edzett, lehetőleg ceruza vastagságú (min. 5 mm) növényeket ültessünk ki. A sortávolság 50-60 cm, a tőtávolság 15-25 cm. Korai termesztésben ritkábban ültetünk, mert a nagyobb térállás koraiságot eredményez. Ha a palánta túlságosan mélyre kerül, befulladás a növény, a fejlődése sem indul meg. A póré folyamatos töltögetést igényel. Alapszabály, hogy mindig az első elágazásig töltünk. A munka során ügyeljünk, hogy ne kerüljön föld a levéllemezek közé, mert az ilyen jellegű szennyeződés a korszerű mosó technikák ellenére sem távolítható el tökéletesen.

### **Talaj- és tápanyagigény, öntözés**

Fényigényes növény, árnyékban még palántája sem termesztendő.

Mészigényes, a savanyú talajokat nem szereti, a 6,5 fölötti pH-érték legjobb a számára. Laza, homoktalajokon többszöri Kalciumnitrát-os fejtrágyázása is indokolt. A többi hagymafélével ellentétben közvetlen szerves trágyázást igényel, melynek mennyisége a talaj humusztartalmától függően 50-60 tonna/ha. A hektáronkénti 250 kg nitrogén hatóanyagot vízdékony formában, a termesztés során legalább 3 alkalommal elosztva juttatjuk ki. A talajvizsgálattól függően ültetés előtt 70-80 kg foszfort adunk hektáronként. A káliumot a nitrogénhez hasonlóan több részletben adjuk 150-170 kg/ha adagban. A póré vízigényes, rendszeres öntözést igényel. Ültetéskor kellően megöntözzük, majd hagyjuk jól begyökeresedni. A gyökeresedés után folyamatosan emeljük a vízáradatot.

### **Növényvédelem**

Helyrevertett, ipari termeltetésű póré gyomirtására a vöröshagyma engedélyezett gyomirtó szereit használják (eseti engedély kérelem alapján). Friss piaci, palántázott kultúrában megelőző jelleggel, előző év őszén a tarlót gyomirtjuk pl. glifozát készítmény segítségével. A tavasszal ültetett állományban csak mechanikai gyomirtást végzünk. Rendszeres töltögetéssel sok kártevőt (mocskos pajor, drótféreg stb.) illetve kelő gyomnövényt tudunk ártalmatlanná tenni. A lombozatot károsító elsősorban alternáriás illetve peronoszpórás gombabetegségek ellen pl. Acrobat MZ WG használható sikeresen. Az őszi, betakarítási időszakban fellépő szürkepenész ellen pl. Amistar Top alkalmazható. Hagymalégy ellen tavasszal és ősszel is szoktunk védekezni. Ültetés előtt pl. Force 1,5 G talajfertőtlenítőt, állományban Cyperkill Max készítményt adhatunk. A tripsz szívogatásával az értékes lombozat sérül, ezért kártételük megelőzésére pl. Laser szerrel próbálkozunk.

### **További technológiai kérdéseivel forduljon szaktanácsadóinkhoz:**

**Kádár András területi képviselő**  
**Észak-Magyarország**  
2942 Nagyigmánd, Búzavirág u. 6.  
M: +36 30 960 4489  
E: kadar.andras@ritsat.hu

**Benák Péter területi képviselő**  
**Dél-Magyarország**  
6781 Domaszék, Radnóti u. 6.  
M: +36 30 284 9793  
E: benak.peter@ritsat.hu